PODKORNÍ HMYZ								
kůrovci na smrku	Alfametrin ME	[1]1 % ; [2]0,6 %				AT		maximálně 1x; [1]asanace a příprava otrávených lapáků; [2] preventivní postřik
	Decis Mega	[1]0,25 %; [2,3]0,5-0,75 %	5-8 l.m^3			[1],[2]28; [3]AT		maximálně 1x; [1]preventivní postřik; [2,3]asanace a příprava otrávených lapáků
	Decis Protech	[1]0,8 %; [2,3]1,65-2,5 %	[1],[2]5-8 l.m^3			28		maximálně 1x; [1]preventivní postřik; [2]asanace; [3]příprava otrávených lapáků
	Forester	1 %	5 l.m^3		[1]před náletem; [2] těsně před výletem dospělců	AT		maximálně 1x; [1]preventivní postřik; [2]asanace;
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Trinet P					-		dle návodu; maximálně 1x; maximálně 8 ks na hektar
	Vaztak Active	1)1 %; 2)0,6 %				AT		maximálně 1x; [1]asanace před vylétnutím nebo příprava otrávených lapáků; [2]preventivní postřik před napadením
	Vaztak Les	[1]1 %; [2]1-2 %				-		[1]asanace před vylétnutím; [2]preventivní postřik před napadením
kůrovci na ostatních jehličnanech a listnáčích	Alfametrin ME	[1]1 % ; [2]0,6 %				AT		maximálně 1x; [1]asanace a příprava otrávených lapáků; [2] preventivní postřik
	Decis Mega	[1]0,25 %; [2,3]0,5-0,75 %	5-8 l.m^3			[1],[2]28; [3]AT		maximálně 1x; [1]preventivní postřik, maximálně 1x; [2,3]asanace a příprava otrávených lapáků
	Decis Protech	[1]0,8 %; [2,3]1,65-2,5 %	[1],[2]5-8 l.m^3			28		maximálně 1x; [1]preventivní postřik; [2]asanace; [3]příprava otrávených lapáků
	Forester	1 %	5 l.m^3		[1]před náletem; [2] těsně před výletem dospělců	AT	pouze jehličnany	maximálně 1x za rok; [1]preventivní postřik; [2]asanace;
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Vaztak Active	1)1 %; 2)0,6 %				AT		maximálně 1x; [1]asanace před vylétnutím nebo příprava otrávených lapáků; [2]preventivní postřik před napadením